**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**
**MINISTERIO DE SALUD**
**DIRECCION DE CAPACITACION PROFESIONAL Y TÉCNICA**

# INGRESO A RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS
# CONCURSO 2008

## RESIDENCIA DE NUTRICIÓN
## RESOLUCION APELACIONES

**36) En el tratamiento dietoterápico de un paciente adulto con diagnóstico de urolitiasis por oxalato cálcico ¿Qué alimento podría indicarse por su menor contenido de ácido oxálico?**
**a) Papa.**
**b) Chocolate.**
**c) Ají.**
**d) Hígado vacuno.**
**Anulada**

**41) Según los estratos de situación social inconveniente (Informe ASIS-2005), ¿En qué Sector fue más alta la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio?**
**a) Norte.**
**b) Noroeste.**
**c) Sur.**
**d) Intermedia.**
**Se considera correcta opción C**

**80) Según Malagón Londoño, en el tratamiento de niños con obesidad grado III para no desacelerar el crecimiento, mantener la masa magra y no causar problemas psicológicos ¿Cuál debe ser la pérdida de peso aproximada por semana?**
**a) 250 gramos.**
**b) 500 gramos.**
**c) 750 gramos.**
**d) 1000 gramos.**
**Anulada**