

1) En el "Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil" se hace referencia a la identificación de los problemas de salud pública. ¿Cuál de los siguientes elementos constituye un criterio a tomar en cuenta para la identificación y establecimiento de prioridades?

- a) Nivel de oferta de servicios de Salud
- b) Gasto anual por internaciones
- \* c) Magnitud del problema
- d) Bajo costo de la intervención del problema

2) En el "Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil" se hace referencia a los conceptos básicos sobre evaluación. ¿Qué tipo de indicadores evalúan el nivel de salud alcanzado como consecuencia de la intervención?

- a) Indicadores de estructura
- b) Indicadores de proceso
- \* c) Indicadores de impacto
- d) Indicadores de recursos de salud

3) En el "Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil" se hace referencia a los usos del enfoque de riesgo. ¿Cuál de las siguientes opciones pertenece al uso del enfoque de riesgo dentro del sistema formal de atención en salud?

- \* a) Modificación de los factores de riesgo
- b) Autocuidado y atención a la familia
- c) Atención comunitaria
- d) Políticas intersectoriales

4) Según Dever, en su libro "Epidemiología y administración de servicios de salud", ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos integran el concepto de "Campo de Salud"?

- a) Estilo de vida, medio ambiente, fisiopatología y organización hospitalaria
- b) Calidad de vida, medio ambiente, fisiopatología y organización de la atención sanitaria
- c) Calidad de vida, contaminación ambiental, biología humana y organización hospitalaria
- \* d) Estilo de vida, medio ambiente, biología humana y sistema de organización de la atención sanitaria

5) Según el libro "Epidemiología y administración de servicios de salud" de Dever, ¿Cuál de los siguientes enfoques se utiliza para identificar necesidades?

- a) Enfoque orientado a gastos en salud
- \* b) Enfoque por indicadores
- c) Enfoque orientado a oferta de servicios de salud
- d) Enfoque por informes de las autoridades sanitarias

6) Dever, en su libro "Epidemiología y administración de servicios de salud", desarrolla los objetivos de los diferentes niveles de prevención. ¿Cuál tiene como objetivo el diagnóstico temprano de las enfermedades mediante exámenes periódicos?

- a) Primaria
- \* b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Cuaternaria

7) En el libro de Diego Armus: "La Ciudad Impura, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950", el autor hace referencia a la mortalidad por tuberculosis a fines de los años 20. ¿Qué grupo etario presentaba mayor mortalidad?

- \* a) 20-29 años
- b) 10-19 años
- c) 30-39 años
- d) 50-59 años

8) En el libro de Diego Armus: "La Ciudad Impura, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950" el autor hace referencia a la publicación de Aquiles Sioen de 1879 "Buenos Aires en el año 2080" en la cual se idealiza una Ciudad del Futuro. ¿Cuál era el recurso purificador?

- a) El verde del arbolado
- \* b) El agua
- c) El sol
- d) La actividad física

9) En el artículo "Hacia una cultura epidemiológica revitalizada", el autor afirma que se ha presentado una disminución marcada del uso de determinado tipo de estudios en la investigación epidemiológica contemporánea. ¿A qué tipo de estudios hace referencia?

- a) Estudios transversales
- \* b) Estudios ecológicos
- c) Estudios de Casos y Controles
- d) Estudios de Series Temporales

10) En el artículo "Hacia una cultura epidemiológica revitalizada", el autor propone una premisa clave para aspirar a una epidemiología productiva a los efectos de facilitar la obtención de explicaciones ¿En qué consiste la propuesta del autor?

- a) La modernización de las herramientas estadísticas
- b) La revalorización de las variables individuales
- \* c) La aplicación de un examen crítico e integral de los problemas
- d) La disminución en el uso de estudios experimentales

11) En el libro de Epidemiología de Guerrero y col, se plantea "cuando un conjunto de causas se presenta simultáneamente o en una secuencia determinada en forma tal que lleven a la enfermedad" ¿A qué tipo de causa se refiere?

- a) Causa necesaria
- \* b) Causa suficiente
- c) Causa condicionante
- d) Causa innecesaria

12) En el libro de Epidemiología de Guerrero y col, se plantea: "En 1969 se inició en un hospital una investigación para estudiar los casos de carcinoma de cuello uterino diagnosticados entre 1950 a 1953 a fin de determinar la sobrevida a 10 años según el tipo de tratamiento recibido. ¿Qué tipo de diseño de investigación aplicaron?

- a) Casos y Controles
- b) Descriptivo
- c) Series de Casos
- \* d) Cohorte

13) Segundo los módulos de "Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud", ¿A qué se denominan marcadores de riesgo?

- \* a) A aquellos atributos que se asocian con mayor riesgo de ocurrencia de enfermedad y que no pueden ser modificados
- b) A aquellos atributos que se asocian con mayor riesgo de ocurrencia de enfermedad y que pueden ser modificados y controlados
- c) A aquellos atributos de tiempo, lugar y persona
- d) A aquellos atributos de estacionalidad, evolución y momento de aparición del evento

14) Segundo los módulos de "Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud", ¿Cómo se denomina a la pérdida de datos sobre un gran número de individuos en el marco de un estudio prospectivo?

- \* a) Sesgo de seguimiento
- b) Factor de confusión
- c) Sesgo de selección
- d) Error aleatorio

15) Segundo el libro "Epidemiología básica" de Beaglehole, Bonita y Kjellström ¿Qué factores pueden causar la disminución de la tasa de prevalencia de una determinada enfermedad?

- \* a) La inmigración de personas sanas
- b) La disminución de la tasa de curación de casos
- c) La emigración de personas sanas
- d) La mejora de las tecnologías diagnósticas

16) Segundo el libro "Epidemiología básica" de Beaglehole, Bonita y Kjellström ¿Qué elemento Standard se utiliza en el método directo de estandarización de tasas por edad?

- a) Tasas Standard
- \* b) Poblaciones Standard
- c) Medias aritméticas de edad Standard
- d) Medianas de edad Standard

17) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores refieren que la lógica de base de la epidemiología moderna se estructura en torno de un concepto fundamental. ¿Cuál es el concepto al cual se hace referencia?

- a) Concepto de Enfermedades No Transmisibles
- \* b) Concepto de Riesgo
- c) Concepto de Regresión
- d) Concepto de Estudios Epidemiológicos

18) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores trabajan la siguiente definición: "probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, agravio, muerte o condición relacionada a la salud en una población o grupo, durante un período de tiempo determinado". ¿A qué concepto corresponde ésta definición?

- a) Distribución de Gauss
- b) Años de Vida potencialmente perdidos
- \* c) Riesgo
- d) Odds Ratio

19) Usted analiza los datos del número de muertes por lesiones autoprovocadas voluntariamente (suicidios), en capitales de Brasil en el año 2002 y observa que Sao Paulo presentó 338 muertes por año y Río de Janeiro 200 muertes. A partir de los conceptos trabajados en el libro "Introducción a la Epidemiología", indique la afirmación correcta:

- a) La tasa de mortalidad por suicidio es mayor en Sao Paulo que en Río de Janeiro
- \* b) Para realizar una comparación es necesario transformar los datos brutos en valores relativos
- c) En Río de Janeiro existe un gran subregistro de muertes por suicidio
- d) Durante el año 2002 existió un aumento de muertes por suicidio en Sao Paulo

20) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores trabajan aspectos relacionados con la validez del diagnóstico en epidemiología y su relación con la variación de las medidas sobre los fenómenos de salud-enfermedad. Esta variación abarca dos componentes principales. ¿Cuáles son esos componentes?

- a) Error y precisión
- \* b) Error y sesgo
- c) Sesgo y validez
- d) Error y azar

21) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores desarrollan el concepto de error. ¿Qué tipo de variación se encuentra relacionada con el error en epidemiología?

- \* a) El error implica una variación por azar y es el resultado de la dispersión inherente a cualquier medida
- b) El error implica una variación sistemática y es el resultado de la dispersión inherente a cualquier medida
- c) El error implica una variación por azar y es el resultado de la distorsión de la propia operación de medida, de su instrumento o de su operador
- d) El error implica una variación sistemática y es el resultado de la distorsión de la propia operación de medida, de su instrumento o de su operador

22) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores desarrollan los conceptos principales de variables en epidemiología. A partir de un estudio que investiga la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, ¿Qué tipo de variable corresponde al hábito de fumar?

- a) Variable dependiente
- \* b) Variable independiente
- c) Variable consecuente
- d) Variable de efecto

23) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores trabajan la siguiente definición: "La razón entre el número de casos nuevos de una enfermedad que ocurre en un intervalo de tiempo determinado en una población delimitada expuesta al riesgo de adquirir la referida enfermedad". ¿A qué concepto corresponde la definición?

- a) Tasa de Mortalidad General
- b) Tasa de Prevalencia
- \* c) Tasa de Incidencia
- d) Tasa de Letalidad

24) Las cuatro causas principales de muerte en Brasil en el año 2002 fueron las siguientes: enfermedades del aparato circulatorio (152,3 muertes por 100.000 habitantes), neoplasias malignas (74,4 muertes por 100.000 habitantes), causas externas (72,5 muertes por 100.000 habitantes) y enfermedades del aparato respiratorio (54,3 muertes por 100.000 habitantes). A partir de los conceptos desarrollados en el libro "Introducción a la Epidemiología", especifique a qué tipo de tasas corresponden:

- a) Tasas de Mortalidad General
- \* b) Tasas de Mortalidad Específica
- c) Tasas Brutas de Mortalidad
- d) Mortalidad Proporcional

25) En 1988, Franco et al. realizó una investigación abordando correlaciones entre indicadores socioeconómicos y la ocurrencia de neoplasias utilizando como unidad de observación 23 estados brasileños. El análisis de datos reveló una alta correlación positiva de ingresos per cápita y de desarrollo económico con cáncer de pulmón, laringe y colon. A partir de los conceptos desarrollados en el libro "Introducción a la Epidemiología", especifique a qué tipo de estudio corresponde:

- a) Estudio Transversal
- \* b) Estudio Ecológico
- c) Estudio de Serie Temporal
- d) Estudio de Cohorte

26) En el libro "Introducción a la Epidemiología", los autores describen las investigaciones que producen "instantáneas" de la situación de salud de una población o comunidad, en base a la evaluación individual del estado de salud de cada uno de los miembros del grupo investigado. ¿A qué tipo de estudios se refieren?

- a) Series Temporales
- b) Casos y Controles
- c) Cohorte
- \* d) Transversales

27) Se realizó un estudio de caso-control basado en la hipótesis de que el uso de anticonceptivos orales se asociaría a la ocurrencia de trombosis venosa. Los datos indican que el odds ratio, o razón de productos cruzados, es igual a 8,14. A partir del libro "Introducción a la Epidemiología" ¿Cómo interpretaría dicho resultado?

- a) El riesgo de ocurrencia de trombosis venosa entre mujeres no usuarias de anticonceptivos orales es ocho veces mayor que entre mujeres usuarias
- b) Se produce una diferencia de ocurrencia de trombosis venosa en ocho mujeres que utilizaron anticonceptivos orales que entre quienes no los utilizaron
- c) Se podrían prevenir la ocurrencia de ocho casos de trombosis venosa en usuarias de anticonceptivos orales si suspendieran su uso
- \* d) El riesgo de ocurrencia de trombosis venosa entre usuarias de anticonceptivos orales es ocho veces mayor que entre mujeres no usuarias

28) En el artículo "Individuos enfermos y poblaciones enfermas", el autor se refiere al estudio de los factores determinantes de la distribución de las enfermedades. ¿Qué referencia hace ante la presencia de una causa de distribución universal?

- a) La causa es determinante en la distribución de la enfermedad
- b) La causa produce una distribución desigual de la enfermedad
- \* c) La causa no ejerce ninguna influencia en la distribución de la enfermedad
- d) La causa produce una distribución azarosa de la enfermedad

29) Basado en el artículo "Individuos enfermos y poblaciones enfermas", determine a qué respuesta equivale la siguiente pregunta: ¿Por qué en algunas poblaciones es tan frecuente la hipertensión mientras que en otras es rara?

- a) Las causas de los casos
- \* b) Las causas de la incidencia
- c) Las causas de la mortalidad
- d) Las causas de la letalidad

30) En el artículo "Individuos enfermos y poblaciones enfermas", el autor hace referencia a dos tipos de estrategias preventivas. Una de ellas presenta la ventaja de ser una estrategia radical, dado que intenta eliminar las causas subyacentes que hacen que una enfermedad sea común y es apropiada en relación al comportamiento. ¿A qué tipo de estrategia corresponde?

- a) Estrategia de alto riesgo
- b) Estrategia individual
- c) Estrategia de los determinantes
- \* d) Estrategia poblacional

31) En el artículo "Individuos enfermos y poblaciones enfermas", el autor distingue dos tipos de estrategias preventivas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la estrategia de "alto riesgo"?

- \* a) Es paliativa y provisoria
- b) Es inapropiada para el individuo
- c) Presenta poca motivación del sujeto
- d) Posee una razón de beneficio- riesgo no favorable

32) En el artículo "Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?" de Bradford Hill, el autor enumera nueve criterios para establecer la existencia de una relación causal. ¿Qué elemento excluye el autor como criterio para establecer causalidad?

- a) Intensidad
- b) Verosimilitud
- c) Gradiente Biológico
- \* d) Significación Estadística

33) En el artículo "Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?" el autor ejemplifica uno de los nueve criterios para establecer la existencia de una relación causal de la siguiente manera: "Los estudios prospectivos han mostrado que la mortalidad por cáncer de pulmón en fumadores de cigarrillos es 9 o 10 veces la de los no fumadores; en grandes fumadores es de 20 o 30 veces mayor" ¿A qué criterio corresponde el ejemplo?

- \* a) Intensidad
- b) Secuencia temporal
- c) Especificidad
- d) Analogía

34) En el artículo "Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?", ¿Cuál considera el autor que es el criterio más demostrativo de la hipótesis de causación?

- a) Intensidad
- \* b) Experimento
- c) Verosimilitud
- d) Analogía

35) Segundo el libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, ¿Cuál es la importancia de la estadística inferencial?

- a) Permite inferir hipótesis que luego deben comprobarse
- b) Permite preparar los datos para aplicar estadística descriptiva
- \* c) Permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos
- d) Permite inferir qué prueba estadística aplicar

36) Segundo el libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, ¿A qué se denomina variable independiente en el marco de un análisis estadístico?

- a) A la variable que se excluye del análisis
- \* b) A la variable de intervención
- c) A la variable que no depende del método estadístico utilizado
- d) A la variable que no puede ser analizada estadísticamente

37) Segundo el libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, ¿Qué son los datos discretos en estadística?

- a) Aquellos que son secretos y no pueden revelarse
- b) Aquellos que son de índole personal de los individuos
- c) Aquellos que son tan pequeños que no pueden analizarse con métodos estadísticos habituales
- \* d) Aquellos que toman valores que son números enteros

38) Segundo el libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, ¿Qué diferencias existen entre una variable nominal y una ordinal?

- a) La nominal se refiere a nombres en general y la ordinal a órdenes
- b) La nominal se refiere a nombres propios y la ordinal a un orden dado
- \* c) La nominal contiene categorías sin ningún orden entre ellas y la ordinal si las presenta
- d) La nominal se refiere a valores de una nómina y la ordinal se refiere al orden de esa nómina

39) En base al libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, si en un análisis estadístico se mide la altura de los individuos en centímetros y se compara según sexo, ¿Qué tipo de variable corresponde a la altura?

- a) Ordinal
- b) Nominal
- c) Interválica
- \* d) Proporcional

40) Segundo el libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, ¿Qué tipo de variables requieren la utilización de test estadísticos paramétricos?

- a) Categóricas
- b) Nominales
- c) Ordinales
- \* d) Interválicas y Proporcionales

41) En base al libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, si en un set de datos utilizado para estudiar la variable "raza", se incluyen los valores: "raza blanca" y "raza negra" ¿A qué tipo de variable corresponde "raza"?

- \* a) Nominal
- b) Ordinal
- c) Interválica
- d) Proporcional

- 42) En base al libro "Bioestadística" de Norman y Streiner, si se presentara un informe con la descripción de la frecuencia y porcentaje de las enfermedades prevalentes en una región determinada, expresados a través de gráficos de barras y tortas. ¿Qué tipo de estadística se aplicó en el informe?
- a) Inferencial
  - \* b) Descriptiva
  - c) Bivariada
  - d) Multivariada
- 
- 43) Según Martínez Navarro en "Vigilancia Epidemiológica", Los sistemas de vigilancia requieren la realización de diversas actividades ¿Cuál de las siguientes es considerada una actividad específica de los sistemas de vigilancia?
- \* a) La identificación de casos y brotes
  - b) El registro esporádico de datos
  - c) La adaptación a cambios en las necesidades de información
  - d) El análisis anual de los datos
- 
- 44) Según Martínez Navarro en "Vigilancia Epidemiológica", ¿Cuál de los siguientes criterios se utilizan para la incorporación de enfermedades a vigilar?
- \* a) El potencial epidémico o la valoración del evento como amenaza para la salud pública
  - b) El costo económico que implica la patología para el sistema de salud
  - c) La organización de la oferta de servicios de salud
  - d) La distribución de personal de salud en los efectores de la región
- 
- 45) Según Martínez Navarro en "Vigilancia Epidemiológica", ¿Qué métodos se utilizan en el análisis preliminar de los datos de vigilancia?
- a) Métodos que utilicen datos crudos en forma indistinta (agregados o no)
  - \* b) Métodos que permitan la agregación de los datos
  - c) Métodos que utilicen datos crudos desagregados
  - d) Métodos que desagreguen los datos recibidos
- 
- 46) Según Martínez Navarro en "Vigilancia Epidemiológica", ¿Cuáles son las características de las tasas crudas?
- \* a) Las tasas crudas se calculan para toda la población
  - b) Las tasa crudas contemplan la distribución por edades de la población
  - c) Las tasas crudas permiten la comparación entre dos poblaciones con distintas distribuciones por grupos de la variable de ajuste
  - d) Las tasas crudas contemplan variables de subgrupos de la población
- 
- 47) Según el libro "El control de las enfermedades transmisibles", de Heymann, ¿Qué datos debería proporcionar la notificación de casos de las enfermedades transmisibles?
- \* a) Datos del diagnóstico, edad, sexo y fecha de inicio de cada persona que padece la enfermedad
  - b) Datos de edad y sexo de las personas convivientes del caso
  - c) Datos agregados de diagnóstico, edad y sexo
  - d) Datos de la fecha de inicio de los contactos del caso

48) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, ¿Cuál de los siguientes es el primer paso ante la notificación de un brote epidémico?

- a) Definir e investigar a la población en riesgo
  - \* b) Verificar el diagnóstico y confirmar su existencia
  - c) Poner en práctica medidas de control para evitar la diseminación
  - d) Tratar a los casos
- 

49) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, el botulismo alimentario es una intoxicación grave derivada de la ingestión de toxina preformada presente en alimentos contaminados. ¿Qué medidas deben implementarse para el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato?

- a) El aislamiento estricto del paciente
  - b) La cuarentena del paciente y de los contactos
  - c) El tratamiento de los contactos directos del enfermo
  - \* d) La investigación de los contactos y de la fuente de la toxina
- 

50) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles", decimoctava edición, de D. Heymann, ¿Qué características presenta la transmisión del dengue?

- a) Existe transmisión interhumana una vez establecida la epidemia
  - \* b) No existe transmisión interhumana
  - c) Existe transmisión interhumana durante el período de incubación
  - d) Existe transmisión interhumana en los casos de dengue grave
- 

51) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, en relación con las medidas preventivas de las diarreas causada por cepas enterohemorrágicas ¿Cuál de las siguientes es una medida adecuada para reducir la incidencia de la enfermedad?

- a) La esterilización del contenido intestinal de los animales en los mataderos
  - b) La pasteurización de la carne molida de res
  - \* c) La irradiación de la carne de res
  - d) El lavado con agua clorada de la carne previa a su cocción
- 

52) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, las enfermedades por arbovirus comparten características epidemiológicas comunes y se manifiestan clínicamente en cuatro síndromes clínicos principales. ¿Qué enfermedad aguda se incluye como síndrome clínico de las enfermedades por arbovirus?

- a) Enfermedad aguda del hígado
  - b) Enfermedad aguda renal
  - c) Enfermedad aguda del sistema hematopoyético
  - \* d) Enfermedad aguda del sistema nervioso central
- 

53) Segundo el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, ¿Cuál es el síndrome clínico más frecuente de la forma invasora de enfermedad meningocócica?

- a) Bacteriemia
- b) Septicemia
- \* c) Meningitis
- d) Pericarditis

- 54) Según el libro "El control de las enfermedades transmisibles" de Heymann, la rubéola puede causar anomalías congénitas. ¿Cuál es la relación existente entre la infección de la madre gestante y la ocurrencia de síndrome de rubéola congénita (SRC)?
- a) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la enfermedad, independientemente del momento de gestación
  - b) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la enfermedad durante el segundo trimestre del embarazo
  - c) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la enfermedad durante el tercer trimestre del embarazo
  - \* d) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la enfermedad durante el primer trimestre del embarazo
- 

- 55) Según el "Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria" del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Cuáles son las funciones de la Vigilancia Epidemiológica?

- a) La recolección y el análisis de datos registrados en períodos determinados del año para integrar el anuario estadístico de patologías
  - b) La identificación de eventos sobre el estado de salud de los individuos y su intervención precoz con el objetivo de normatizar manuales de procedimientos
  - \* c) La detección del riesgo y del daño en salud pública, sustento de intervenciones de prevención y control
  - d) La caracterización del comportamiento estacional de las patologías sujetas a vigilancia a fin de disminuir su incidencia
- 

- 56) Según el "Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria" del Ministerio de Salud de la Nación, describe estrategias utilizadas en la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria. ¿Cómo se relacionan las estrategias con los eventos a notificar?

- a) Se utiliza una estrategia para cada evento
  - b) Se utiliza únicamente la estrategia de vigilancia clínica para todos los eventos
  - \* c) Se utilizan diferentes estrategias para un mismo evento
  - d) Se utiliza únicamente la estrategia de vigilancia centinela para los eventos de enfermedades transmisibles
- 

- 57) Según el "Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria" del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Qué es el Índice epidémico semanal?

- a) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se esperan para ese año
  - \* b) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se esperan para la misma semana
  - c) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se esperan para la semana siguiente
  - d) Es el cociente entre los casos presentados en la semana correspondiente y el promedio de los casos de las cinco semanas anteriores
- 

- 58) Según el "Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria" del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Cuál es la modalidad y periodicidad de notificación del evento "Coqueluche"?

- a) Modalidad Numérica y Periodicidad Inmediata
- \* b) Modalidad Individual y Periodicidad Inmediata
- c) Modalidad Numérica y Periodicidad Semanal
- d) Modalidad Individual y Periodicidad Semanal

- 59) En base al "Libro azul de Infectología pediátrica" de la sociedad Argentina de Pediatría, ante la consulta respecto de la reincorporación al jardín de un niño de 8 meses que se encuentra cursando coqueluche, ¿Cuál es el periodo de contagio?
- a) Las primeras 48 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento hasta 2 semanas
  - \* b) Hasta los primeros 5 días después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento hasta 3 semanas
  - c) Hasta los primeros 5 días independientemente de que realice tratamiento antibiótico
  - d) Hasta los primeros 5 días después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento hasta 1 semana
- 
- 60) En base al "Libro azul de Infectología pediátrica" de la sociedad Argentina de Pediatría, ante un caso de meningitis por Neisseria Meningitidis en un niño de 2 años que concurre al jardín maternal, ¿Cuál es la primera medida preventiva que se debe implementar?
- a) El cierre de la sala donde concurre el niño
  - b) La vacunación de todos los contactos cercanos
  - \* c) La Quimioprofilaxis a los contactos cercanos
  - d) El cierre del jardín y la vacunación a los contactos cercanos
- 
- 61) En base al "Libro azul de Infectología pediátrica" de la sociedad Argentina de Pediatría, ante un caso de sarampión, ¿Qué conducta debe adoptar con los contactos susceptibles?
- a) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 6 meses y aplicar Vacuna antisarampionosa a los mayores de 6 meses
  - b) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos inmunosuprimidos y aplicar Vacuna Antisarampionosa a los mayores de 1 año
  - \* c) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 1 año y a los inmunosuprimidos y aplicar Vacuna triple viral o doble viral a los mayores de 1 año
  - d) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 6 meses y a los inmunosuprimidos y aplicar Vacuna triple viral o doble viral a los mayores de 6 meses
- 
- 62) Según el "Libro azul de Infectología pediátrica" de la sociedad Argentina de Pediatría, ¿Cuál es la mejor medida de control y prevención para evitar el contagio de la tuberculosis?
- a) La aplicación de vacuna BCG al nacer y el catastro con PPD al ingreso escolar
  - b) La aplicación de vacuna BCG al nacer y al ingreso escolar
  - \* c) El diagnóstico precoz y tratamiento adecuado del enfermo con tuberculosis activa
  - d) El catastro periódico con PPD en instituciones de salud y escuelas
- 
- 63) Según las "Normas Nacionales de Vacunación" ¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada la serología posterior a la vacunación con vacuna Hepatitis B?
- \* a) En personas con riesgo aumentado de exposición
  - b) De rutina en todos los que se vacunan el 1º año de vida
  - c) De rutina en todos los que se vacunan a los 11 años
  - d) En viajeros a zonas de alta endemidad
- 
- 64) En base a las "Normas Nacionales de Vacunación" ¿En qué período es más frecuente la presentación de tumefacción parotídea postvacunación?
- a) Primeros 5 días
  - \* b) Entre los 5 y 14 días
  - c) Entre los 15 y 30 días
  - d) Luego de los 30 días

65) Segundo las "Normas Nacionales de Vacunación" ¿Cuál es el límite de edad fijado para recibir la vacuna Sabin según la situación epidemiológica actual?

- a) 18 meses
- b) 7 años
- c) 11 años
- \* d) 18 años

66) Segundo las "Normas Nacionales de Vacunación", ¿Cuál es la respuesta inmune protectora de la vacuna Hepatitis A?

- a) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora del 50%
- b) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora menor del 50%, requiriendo una segunda dosis
- \* c) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora en el 95-99%
- d) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectora de entre 50-70%

67) En base a las "Normas Nacionales de Vacunación", Si Usted recibe a un niño de 4 años que recibió 3 dosis de vacunas contra Haemophilus Influenzae tipo B en su primer año de vida. ¿Cómo completaría su esquema de vacunación?

- \* a) Indicaría una dosis de refuerzo
- b) Indicaría una dosis de refuerzo ahora y otra al ingreso escolar
- c) Indicaría reiniciar el esquema de vacunación
- d) Indicaría una dosis de refuerzo ahora y otra a los dos meses

68) En base a las "Normas Nacionales de Vacunación", Si Usted recibe a un niño de 6 meses que recibió la vacuna pentavalente y la vacuna Sabin y tiene un hermano de 8 años que realiza tratamiento con quimioterapia. ¿Qué conducta debería que adoptar?

- a) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 1 semana
- b) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 2-3 semanas
- \* c) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 4-6 semanas
- d) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 7-8 semanas

69) Segundo el artículo "Elaboración de corredores o canales endémicos" ¿Cuál es el método más complejo para la elaboración de los mismos?

- a) Método de los máximos y mínimos
- b) Método de la mediana y los cuartiles
- c) Método de los mínimos cúbicos
- \* d) Método de los mínimos cuadrados

70) Segundo el artículo "Elaboración de corredores o canales endémicos", ¿Cuál es la finalidad de la utilización de corredores acumulativos?

- a) Monitorear eventos por cuatrisesemana
- \* b) Monitorear enfermedades de baja incidencia
- c) Monitorear eventos de alta incidencia
- d) Monitorear eventos por intervalos de tiempos prolongados

71) Segundo el artículo "Investigaciones de brotes - Una perspectiva" de Reingold, en el contexto de una investigación de brote es útil establecer la tasa previa de una enfermedad, ¿Qué situaciones facilitan el establecimiento de la tasa previa?

- a) Cuando se trata de una enfermedad nueva
- \* b) Cuando se encuentran disponibles las pruebas de laboratorio confirmatorias
- c) Cuando la patología presenta cambios en el acceso a la asistencia de los pacientes
- d) Cuando se producen modificaciones en los patrones de referencia

72) Segundo el artículo "Investigaciones de brotes - Una perspectiva" de Reingold, ¿Cuál es la principal razón para investigar un brote?

- \* a) Identificar y eliminar la fuente de infección a fin de prevenir casos adicionales
  - b) Realizar un estudio descriptivo de la población expuesta al brote
  - c) Investigar variables de tiempo, lugar y persona de los afectados
  - d) Mejorar el flujo de información en los servicios de salud
- 

73) En el "Análisis de Situación de Salud de la Población de la Ciudad de Buenos Aires - Edición 2007", ¿Cuál fue la división territorial utilizada?

- a) Centros de Gestión y Participación
  - b) Áreas Programáticas
  - \* c) Comunas
  - d) Circunscripción Electoral
- 

74) En el "Análisis de Situación de Salud de la Población de la Ciudad de Buenos Aires - Edición 2007", se utilizó un índice de necesidades sociales a partir de 4 indicadores con el objetivo de analizar la situación social de la población. ¿Cuál de los siguientes indicadores fue utilizado para la construcción del índice?

- a) % de población bajo la línea de pobreza
  - b) % de población bajo la línea de indigencia
  - \* c) % de población con NBI
  - d) % de población con ingreso promedio menor de 500\$
- 

75) Segundo el texto "Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública" de Bergonzoli, ¿Cuál de los siguientes conceptos es considerado un determinante mayor de las diferencias en salud?

- \* a) La variación natural, biológica
  - b) El comportamiento beneficioso elegido libremente
  - c) El acceso adecuado a la sanidad básica
  - d) La desigualdad en la atención sanitaria
- 

76) Segundo el texto "Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública" de Bergonzoli, la construcción de indicadores con numeradores y denominadores pequeños requiere métodos para mejorar la precisión. ¿Cuál es el método más adecuado?

- a) El índice epidémico acumulado
  - \* b) La distribución probabilística de Poisson
  - c) La razón proporcional de brechas
  - d) El test de ANOVA
- 

77) Segundo el texto "Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública" de Bergonzoli, la construcción del indicador Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) requiere la utilización de un rango de edad. ¿De qué depende la utilización de determinado rango de edad?

- a) Del marco teórico epidemiológico
- b) De la tasa de mortalidad histórica
- \* c) De las características de cada país
- d) Del consenso del Consejo Federal de Salud

78) Según el "Módulo de Análisis de Situación de Salud" del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, ¿Cómo se definen los diagnósticos de situación?

- a) Son estudios de tipo descriptivo que realizan inferencias para la planificación en salud en el nivel jurisdiccional
- b) Son estudios de tipo analítico-sintético que incluyen diferentes métodos de estudios que explican el perfil poblacional
- \* c) Son estudios de tipo descriptivo en los que se detallan indicadores tradicionales disponibles, generalmente cuantitativos
- d) Son estudios de tipo analítico en los que se detallan indicadores clásicamente cualitativos

79) Según el "Módulo de Análisis de Situación de Salud" del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, ¿Cómo se define desigualdad?

- a) Es la existencia de diversidad en la dimensión económica y social
- \* b) Es la existencia de diferencias en las condiciones de vida y de salud
- c) Es la existencia de disimilitudes en la dimensión educativa y laboral
- d) Es la existencia de disparidad en la dimensión cultural y de género

80) Según el "Módulo de Análisis de Situación de Salud" del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, ¿Cuál de las siguientes fuentes de información brinda información cualitativa?

- a) Los censos nacionales y proyecciones
- b) Los registros de egresos hospitalarios
- \* c) Las estimaciones basadas en el Método Delphi
- d) La información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica

81) Según el "Módulo de Análisis de Situación de Salud" del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, ¿Qué caracteriza a los Análisis de Situación de Salud de Coyuntura?

- a) Identifican cambios en el proceso salud-enfermedad a largo plazo para implementar las medidas adecuadas
- b) Evalúan diferencias en la tendencia de enfermedades a fin de poder realizar proyecciones
- \* c) Responden a situaciones puntuales planteadas en un corto plazo que requieren la toma de decisiones inmediatas
- d) Señalan la evolución de indicadores a largo plazo en diferentes regiones simultáneamente

82) En el "Módulo de Análisis de Situación de Salud" del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, se desarrolla el significado de los indicadores más frecuentemente utilizados, entre ellos, las líneas de indigencia y pobreza. ¿Cuál es el valor que define al indicador "línea de indigencia"?

- a) El valor del salario mínimo
- b) El valor de un conjunto de bienes alimentarios y de servicios y bienes no alimentarios
- c) El valor del hacinamiento en el hogar
- \* d) El valor de una canasta básica de alimentos

83) En el documento "Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires Herramientas para la actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud", ¿Cuáles son las principales características de las comunas de la Región Sanitaria Sur respecto del resto de las regiones?

- \* a) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, mayor porcentaje de población mayor de 25 años con primario incompleto y mayor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal
- b) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, mayor porcentaje de población mayor de 25 años con primario incompleto y menor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal
- c) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, igual porcentaje de población mayor de 25 años con primario incompleto y menor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal
- d) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, igual porcentaje de población mayor de 25 años con primario incompleto y mayor porcentaje de población con cobertura únicamente estatal

84) En el documento "Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires Herramientas para la actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud" se hace referencia a que la Ciudad de Buenos Aires presenta una población envejecida al igual que las Regiones. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellas. ¿Cuáles son esas diferencias?

- a) Las Regiones Sur y Este presentan un perfil de población más envejecido que las Regiones Norte y Oeste
- b) Las Regiones Sur y Oeste presentan un perfil de población menos envejecido que las Regiones Norte y Este
- c) Las Regiones Sur y Oeste presentan un perfil de población más envejecido que las Regiones Norte y Este
- \* d) Las Regiones Sur y Este presentan un perfil de población menos envejecido que las Regiones Norte y Oeste

85) Según el artículo "Métodos de medición de las desigualdades de salud", la elección de un tipo de indicador es fundamental como variable para definir los grupos y el ordenamiento dentro de los mismos y entre si. ¿A qué tipo de indicador se refiere?

- a) Indicador de Mortalidad
- b) Indicador de Morbilidad
- c) Indicador de Prevalencia
- \* d) Indicador Socioeconómico

86) Según el artículo "Métodos de medición de las desigualdades de salud", ¿Cómo se definen las desigualdades sociales en el campo de la salud?

- a) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a posteriori según alguna característica de su posición socioeconómica
- \* b) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a priori según alguna característica de su posición socioeconómica
- c) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a priori según alguna característica de su perfil de morbilidad
- d) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a posteriori según alguna característica de su perfil de mortalidad

87) Según el artículo "Métodos de medición de las desigualdades de salud", ¿Qué elementos debe presentar un indicador para medir las desigualdades en forma adecuada?

- a) Debe incorporar la información correspondiente a los grupos más desfavorables de la población definidos por el indicador
- b) Debe incorporar la información correspondiente a los grupos más favorables de la población definidos por el indicador
- \* c) Debe Incorporar la información correspondiente a todos los grupos de la población definidos por el indicador
- d) Debe incorporar la información correspondiente a algunos grupos de la población seleccionados al azar

---

88) A partir de los conceptos trabajados en el artículo "Métodos de medición de las desigualdades de salud", Usted desea comparar la tasa de mortalidad infantil del país más pobre del área andina con la del país más rico. El cálculo de la razón de las tasas (RT) entre el país con la peor situación económica y el país con la mejor situación es de 2,68. ¿Cómo interpreta el resultado?

- \* a) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica mueren 2,68 veces más niños menores de 1 año que en el país con la mejor situación
- b) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica, la tasa de mortalidad infantil es de 2,68 por cada 1000 RN vivos
- c) Si el país del área andina con la peor situación socioeconómica tuviera la misma situación que el de mejor situación se evitarían 2,68 muertes infantiles
- d) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica existe una desigualdad de 2,68 respecto del país con la mejor situación

---

89) En el artículo "Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las desigualdades de salud", los autores trabajan aspectos relacionados a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Al respecto, ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones esenciales de los SIG?

- a) Medir desigualdades de salud e identificar individuos con mayores problemas a escala local
- \* b) Medir desigualdades de salud e identificar áreas con mayores problemas a escala local
- c) Medir indicadores de salud e identificar instituciones con mayores problemas a escala local
- d) Medir indicadores de salud e identificar organizaciones con mayores problemas a escala nacional

---

90) En el artículo "Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las desigualdades de salud", los autores refieren que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) presentan grandes ventajas. ¿Cuál es una de las ventajas?

- a) La realización de un alto nivel de análisis a nivel individual
- \* b) La capacidad para integrar diversos tipos de información de manera simultánea
- c) La generación de hipótesis etiológicas de los casos de la población
- d) La posibilidad de desarrollar una "falacia ecológica"

---

91) Según la Ley Nacional 15465/60, Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, en su artículo nº 2 ¿Qué enfermedades deben notificarse en forma inmediata dado que se encuentran bajo el Reglamento Sanitario Internacional?

- \* a) Córara, Fiebre Amarilla y Viruela
- b) Botulismo, Chagas y Fiebre Tifoidea
- c) Hidatidosis, Lepra y Paludismo
- d) Rabia, Sífilis y Tuberculosis

92) La Ley Nacional 15465/60, Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, ¿En qué momento fue promulgada?

- a) En los años 40
  - b) En los años 50
  - \* c) En los años 60
  - d) En los años 70
- 

93) La Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 14º del capítulo 1 enumera los objetivos del Subsector Estatal de Salud. ¿Cuál es uno de los objetivos planteados?

- a) Contribuir a la equidad orientando la atención de la salud a las personas que no presentan cobertura de salud privada ni de la seguridad social
  - b) Desarrollar políticas sanitarias preventivas centradas en los individuos a fin de disminuir la morbimortalidad general
  - c) Estimular la cultura del autocuidado y del autocontrol de la salud, para reducir la carga de enfermedad de la población
  - \* d) Desarrollar políticas integrales de prevención y asistencia frente al VIH/SIDA, adicciones, violencia urbana, violencia familiar y todos aquellos problemas que surjan de la vigilancia epidemiológica y sociosanitaria
- 

94) Según consta en el Anexo i del Plan Director del Sistema de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades de la Ciudad de Buenos Aires (SVSCE), resolución 1727/04, se asume la ampliación del campo de la vigilancia epidemiológica hacia la Vigilancia en Salud Pública con la inclusión de algunos elementos principales ¿Cuál de los siguientes es uno de los elementos que se incorporaron?

- a) La vigilancia sociopolítica
  - b) La vigilancia socioeconómica
  - c) La vigilancia de la implementación de programas de salud
  - \* d) La vigilancia ambiental
- 

95) Según el Anexo II de la resolución 1727/04, se hace referencia a las modalidades de notificación de las Patologías y Eventos de Notificación Obligatoria, ¿Cuál de las siguientes constituye una modalidad de notificación?

- \* a) Notificación Semanal
  - b) Notificación Quincenal
  - c) Notificación Mensual
  - d) Notificación Trimestral
- 

96) Según el libro "Epidemiología Clínica" de Sackett, ¿Qué es el Número Necesario a Tratar (NNT)?

- a) Un indicador que mide calidad de vida
  - \* b) Un indicador que determina la significación clínica de un ensayo positivo
  - c) Un indicador que mide la reducción del riesgo relativo
  - d) Un indicador que mide la adherencia al tratamiento por parte del paciente
- 

97) Según el libro "Epidemiología Clínica" de Sackett, ¿Qué significa Valor Predictivo Positivo?

- a) La confirmación de un diagnóstico a través de pruebas de tamizaje
- b) El aumento de la prevalencia de los pacientes en un periodo determinado
- \* c) La prevalencia de la alteración blanco entre los pacientes con resultados positivos en la prueba
- d) La probabilidad de que la alteración blanco entre los pacientes antes de la prueba sea mayor al 50 %

98) Segundo el libro "Epidemiología Clínica" de Sackett, ¿Qué es la especificidad de una prueba diagnóstica?

- a) La capacidad de confirmar un diagnóstico utilizando pruebas de catastro
- \* b) La capacidad de una prueba para identificar correctamente la ausencia de la alteración blanco
- c) La capacidad de identificar la alteración blanco en aquellos pacientes con pruebas positivas
- d) La capacidad de detectar los expuestos al factor de riesgo que presentaron pruebas positivas

99) Segundo Edward De Bono en su libro "Seis sombreros para pensar", si en un informe se expresa: "sus cifras tienen cuatro años de antigüedad, la muestra es muy pequeña y las cifras son sólo de la región sur", ¿Qué modelo de sombrero está utilizando?

- \* a) Sombrero Negro
- b) Sombrero Amarillo
- c) Sombrero Blanco
- d) Sombrero Azul

100) Segundo Edward De Bono en su libro "Seis sombreros para pensar", si en un informe se expresa una situación descriptiva sin comentarios agregados que no surjan de la lectura lineal de los datos, ¿Qué modelo de sombrero se utilizó?

- a) Sombrero Azul
- b) Sombrero Amarillo
- \* c) Sombrero Blanco
- d) Sombrero Verde