

# Calendario de vacunación 2017

VACUNA	HEPATITIS B (H-B)	BCG (1)	ROTAVIRUS (2)	NEUMOCOCCO CONJUGADA (3)	QUINTUPLE PENTAVALENTE (DTP+HB+HE) (4)	SALK (IPV) / SABIN (OPV) (5)	MENINGOCOCCO CONJUGADA (6)	ANTIGRIPAL	TRIPLE VIRAL (SRP) (7)	HEPATITIS A (H-A)	VARICELA	CUÁDRUPLE (DPT+HB) (8)	TRIPLE BACTERIANA (DPT) (9)	TRIPLE BACTERIANA ACELULAR (dTPa) (13)	VPH (11)	DOBLE BACTERIANA (dT) (12)	DOBLE VIRAL (SR) (14)	FIEBRE AMARILLA (FA) (14)	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA (FHA) (15)
RECIÉN NACIDO	1ª DOSIS (A)	DOSIS ÚNICA (C)																	
2 MESES			1ª DOSIS (D)	1ª DOSIS	1ª DOSIS	1ª DOSIS (E)													
3 MESES							1ª DOSIS												
4 MESES			2ª DOSIS (D)	2ª DOSIS	2ª DOSIS	2ª DOSIS (E)													
5 MESES							2ª DOSIS												
6 MESES					3ª DOSIS	3ª DOSIS (F)													
12 MESES				REFUERZO				1ª DOSIS	DOSIS ÚNICA										
15 MESES							REFUERZO				DOSIS ÚNICA								
15-18 MESES						REFUERZO (F)		DOSIS ANUAL (G)				REFUERZO							
18 MESES																		1ª DOSIS (F)	
24 MESES																			
5-6 AÑOS INGRESO ESCOLAR						REFUERZO (F)			2ª DOSIS				REFUERZO						
11 AÑOS	(B)						DOSIS ÚNICA		(J)					DOSIS ÚNICA	2 DOSIS (M)		(L)	REFUERZO (O)	
A PARTIR DE 15 AÑOS																			DOSIS ÚNICA (F)
A PARTIR DE 16 AÑOS ADULTOS	(B)															REFUERZO (N)			
EMBARAZADAS								DOSIS ANUAL (H)						DOSIS (K)		(C)			
PUÉRPERO O POST ABORTO INMEDIATO								DOSIS ANUAL (I)										(L)	
PERSONAL DE SALUD	(B)							DOSIS ANUAL						DOSIS ÚNICA (L)				(L)	

- (A) Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida.  
 (B) Si no fue vacunado previamente aplicar 1ª dosis, 2ª dosis al mes de la primera y la 3ª dosis a los 6 meses de la primera. Si recibió alguna dosis previamente, completar con las dosis faltantes.  
 (C) Antes de salir de la maternidad.  
 (D) Administración por vía oral. Edad máxima de aplicación: 1º dosis 14 semanas y 6 días. 2º dosis 6 meses y 0 días.  
 (E) Aplicar una dosis de Salk (IPV) intramuscular.  
 (F) Administrar una dosis de Sabin (OPVb) oral.  
 (G) Los niños entre 6 y 24 meses deberán recibir en la primovacunación, 2 dosis de vacuna separadas al menos por 4 semanas.  
 (H) En cualquier trimestre de la gestación.  
 (I) Puérperas, si no la recibieron en el embarazo, aplicar dentro de los 10 días postparto.  
 (J) Aplicar una dosis si no recibió previamente 2 dosis de triple viral, o bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral.  
 (K) Se aplica en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación.  
 (L) Personal de salud que atiende niños menores de 1 año. Revacunar a los 5 años  
 (M) Mujeres y varones. Aplicar 2 dosis con intervalo de 6 meses.  
 (N) Aplicar un refuerzo cada 10 años de la última vacunación antitetánica.  
 (O) Mujeres no vacunadas previamente se indicará dT como esquema básico a partir del 2º trimestre del embarazo, reemplazando una dosis a partir de las 20 semanas de gestación por triple bacteriana acelular (dTPa). Si el tiempo transcurrido desde el último refuerzo es mayor a 10 años, o el esquema de vacunación está incompleto, se le completará el esquema reemplazando una dosis de dT por dTPa si es que nunca antes la había recibido.

- (P) Residentes en zonas de riesgo.  
 (Q) Residentes en zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1ª dosis.  
 (R) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo.

- BCG: antituberculosa. Previene Formas invasivas.
- Previene las Formas graves de la diarrea por rotavirus.
- Previene la meningitis, neumonía y sepsis por neumococo.
- DPT HB Hib (Quíntuple/HB-Pentavalente): difteria, tétanos, pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b.
- Salk (IPV): vacuna inactivada de Polio. Sabin (OPVb): vacuna anti poliomielítica oral.
- Previene la Meningitis y sepsis por meningococo A, C, W, Y.
- SRP (triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis.
- DPT Hib (Cuádruple): difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenzae tipo b. De no disponer se podrá utilizar la vacuna quíntuple/HB - Pentavalente.
- DPT (triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis.
- dTPa (triple bacteriana acelular con contenido reducido de toxoide diftérico y pertussis): difteria, tétanos, pertussis.
- VPH (Virus Papiloma Humano)
- dT (doble bacteriana): difteria, tétanos.
- SR (doble viral): sarampión, rubéola.
- FA (Fiebre amarilla)
- FHA (Fiebre hemorrágica argentina): Candid #1

