

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DOCENCIA**

**INGRESO A RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS
CONCURSO 2014**

RESIDENCIA DE FARMACIA

RESOLUCION APELACIONES

PREGUNTA N° 48 (SEGÚN EXAMEN MADRE)

48-Durante la elaboración de comprimidos se pueden presentar problemas técnicos o de formulación que originan defectos en los mismos. Uno de los problemas es la escasa dureza, ¿cuál de las siguientes es una de las probables causas?

- a) Presión demasiado alta durante la compresión.
- b) Insuficiente disgregante en la formulación.
- c) Insuficiente aglutinante en la elaboración por granulación húmeda.
- d) Segregación de la mezcla de polvos durante la compresión.

Se consideran correctas las opciones c y d

PREGUNTAS 35 Y 43 - Ambas son iguales

35 y 43) ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para el desarrollo de los servicios farmacéuticos basados en la Atención primaria de la Salud?

- a) Política y Obediencia
- b) Práctica y Especialización
- * c) Política, Práctica, Regulación y Educación Regulación
- d) Educación y Presupuesto

Se anulan las dos preguntas

PREGUNTA 29

9) La Terazosina se comercializa en las droguerías como Terazosina clorhidrato dihidrato, la dosis correcta está expresada como Terazosina base. Usted debe realizar 100 capsulas de 1 mg. Los pesos moleculares son los siguientes: Terazosina base: 387.44 y Terazosina clorhidrato dihidrato: 459.92. ¿Cuánto pesaría de Terazosina clorhidrato dihidrato para preparar 100 caps.?

- a) 84.24 mg
- b) 100 mg
- c) 118.7 mg
- d) 459mg

Se considera correcta opción c