

Cóndor andino

Vultur gryphus



****Desde 1991, el Programa Conservación Cóndor Andino (PCCA) tiene como principal objetivo asistir en la protección de estas fabulosas aves y su ecosistema.**

Distribución

El cóndor **se distribuye en América del Sur desde Venezuela hasta Tierra del Fuego** e Isla de los Estados en Argentina, a lo largo y ancho de la Cordillera de los Andes, hasta alturas de 9.000 m.s.n.m. En toda su área de distribución, el cóndor conforma una población casi continua, con escasas variaciones genéticas.

A partir de diciembre del 2003, gracias al esfuerzo de conservación internacional **“El Retorno del Cóndor al Mar”** -dentro del **Programa Conservación Cóndor Andino (PCCA)****- fue posible reintroducir la especie en su antigua área de distribución. Desde entonces **se concretó la reintroducción de 61 ejemplares en Sierra Palleman, Provincia de Río Negro.**

Es el **ave voladora más grande del mundo.**

Como especie carroñera, la función más importante que desempeña en la naturaleza es **limpiar el ambiente de restos de animales muertos, evitando la diseminación de enfermedades peligrosas.**

Culturalmente, durante miles de años ha sido honrado por las comunidades originarias de Sudamérica, quienes lo consideran un nexo sagrado entre los hombres y el Cosmos.

Dieta

Son **aves carroñeras** que pueden ingerir **hasta 4 kg de carne** y almacenarlos en el buche.



Animales muertos



• Longitud
1,20 m
de altura

• Peso
Llegan a pesar hasta
12 kg.

• **3 m**
de envergadura alar

Gracias a su **fuerte y ágil pico**, es **capaz de abrir el cuero de grandes animales muertos.**

Como todos los buitres, presentan ausencia de plumas en la cabeza y cuello, que, entre otras funciones, **ayuda a mantener la higiene del animal cuando comen carroña.**

Dimorfismo Sexual

- **Machos:** con cresta (carúncula) e iris color café.
- **Hembras:** sin cresta e iris de color rojo (en su madurez sexual).
- **Juveniles:** de color marrón.
- **Adultos:** cuerpo negro con plumas secundarias blancas en el dorso, cuello con plumón blanco.

Reproducción

60 **Días de incubación**

La **madurez sexual** ocurre a edad avanzada, entre los 8 y 9 años. **Es un animal monógamo.** La pareja pone un único huevo, en la arena o gravilla del suelo, sin construir ninguna estructura, lo incuban y crían al pichón. El período de cuidado parental es extenso, por lo que **cada pareja cría un único pichón cada 2 o 3 años.**

Estado de conservación



A nivel nacional, la última Categorización de las Aves de Argentina (MAyDS y AA, 2015) considera a esta especie como **amenazada.**

Respecto a la **categoría internacional**, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2017) la clasifica como **cercana a la amenaza.**

Amenazas • Envenenamiento por cebos tóxicos • Colisiones contra cables de alta tensión • Intoxicación por ingestión de balas de plomo • Tráfico ilegal