



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Desarrollado por el Area de Educación para la Promoción de la Salud del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.



/BASalud

buenosaires.gob.ar/salud

Instituto de Zoonosis LUIS PASTEUR

Brucelosis canina



/BASalud

buenosaires.gob.ar/salud



Buenos Aires Ciudad



Vamos Buenos Aires

Brucelosis canina

Es una enfermedad, causada por la bacteria ***Brucella canis***, que puede afectar a perros de ambos sexos y en ocasiones también transmitirse en forma accidental al ser humano.

Esta bacteria puede estar presente en secreciones vaginales y prostáticas, semen, orina o en el caso de producirse un aborto, en las membranas placentarias y los fetos contaminados.

¿Cómo se transmite en los caninos?

- Por transmisión sexual.
- De la madre a los fetos a través de la placenta.
- Por el lamido u hociqueo de restos de placenta, orina o secreciones infectadas con la bacteria.

El contacto de una persona con fetos abortados, placentas, o secreciones de animales infectados, implica la posibilidad de contagio.

Signos y síntomas de la brucelosis

→ En los caninos:

Infertilidad. Aborto en las perras gestantes.
Nacimiento de cachorros débiles o muertos.
Dolor en el aparato genital del macho (por lo que suele lamerse en forma constante).

Si observas estos síntomas en el animal, concurrí a la veterinaria o al Instituto Pasteur y evitá el contacto con las secreciones del animal.

→ En las personas:

Malestar generalizado. Fiebre. Pérdida de peso.
Dolor articular y muscular.

Si estuviste en contacto con un canino con alguno de los signos o síntomas mencionados, realizá de inmediato la consulta con un médico.

Para tener en cuenta



Si adoptás o comprás un perro, realizá siempre una consulta clínica con el veterinario para descartar la enfermedad, ya que a veces puede no presentar síntomas (asintomática).



Si se produjera un aborto en una hembra es importante usar guantes y doble bolsa de residuos para eliminar el o los fetos y membranas, evitando todo contacto con estos elementos.



Mantené siempre los ambientes limpios. Desinfectá con lavandina diluída en agua, según la proporción indicada en su envase o con alcohol al 70%.

Un animal con **prueba positiva para brucelosis** podría permanecer infectado a pesar de haber recibido tratamiento médico. Por lo tanto, ante esta situación, se recomienda la esterilización quirúrgica.

La castración es la medida sanitaria de elección para prevenir la enfermedad.



**Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur**

Av. Díaz Vélez 4821, CABA



4958-9900/9903



izlpcomunicacion@buenosaires.gob.ar