

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL**

**INGRESO A RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS
CONCURSO 2016**

RESIDENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS (POST BASICA)

RESOLUCION APELACIONES

Pregunta 47

Carlos de 75 años tiene diagnóstico de cáncer de próstata avanzado y recibe morfina desde hace un mes. Consulta por persistencia del dolor óseo y el profesional constata delirium hipoactivo. Según el manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la salud editado por el Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué conducta considera más adecuada para el manejo de esta situación clínica?

- A. Disminuir el opioide
- B. Suspender el opioide
- C. Cambiar el opioide
- D. Aumentar el opioide

RESOLUCION TOMADA:

CAMBIAR LA QUE SE CONSIDERA CORRECTA

Se considera correcta opción C

Pregunta 58

Martina, 36 años, padece cáncer gástrico y se encuentra internada en el hospital atravesando los últimos días de vida. Convive con María, de 30 años. María dice: "por favor, no duerman a Martina, yo necesito que tome decisiones, ella siempre se ocupa de todo, hasta de alimentar a las mascotas, estoy sola, toda mi familia sigue en Corrientes". Según Worden, ¿cómo define la condición en que se encuentra María con respecto al proceso de duelo que deberá atravesar?

- A. Trastorno de adaptación
- B. Normal
- C. En riesgo
- D. Duelo anticipado

RESOLUCION TOMADA:

CAMBIAR LA QUE SE CONSIDERA CORRECTA

Se considera correcta opción C

Pregunta 81

¿Cuál es la intención moral que subyace la indicación de sedación terminal, según la asociación europea de cuidados paliativos?

- A. Acelerar la muerte del paciente para evitarle sufrimiento
- B. Reducir la génesis del dolor utilizando un fármaco sedante
- C. Aliviar un sufrimiento intolerable utilizando un fármaco sedante
- D. Inducir el sueño en aquellos pacientes con insomnio refractario

RESOLUCION TOMADA:

CAMBIAR LA QUE SE CONSIDERA CORRECTA

Se considera correcta opción C